



« *Le saviez-vous ?* »

**15 % des patients atteints de schizophrénie présentent une phobie sociale.**

=> Les troubles anxieux sont plus fréquents parmi les patients atteints de schizophrénie qu'en population générale. La prévalence des comorbidités anxieuses au sein de cette population reste difficile à établir car les symptômes sont souvent confondus avec le trouble du spectre de la schizophrénie. Toutefois, les données<sup>1</sup> montrent que la phobie sociale est le trouble anxieux le plus fréquemment retrouvé chez les sujets atteints de schizophrénie

**Le sujet vous intéresse ?** Rendez-vous aux Journées Scientifiques de l'Institut Servier. Lors du Symposium des Lauréats, le 21 novembre 2018, une présentation aura lieu sur le thème : « *Schizophrénie et comorbidité anxieuse : aspects cliniques, cognitifs et corrélats cérébraux* » par Frédéric HAESEBAERT (Lyon), Thierry d'AMATO (Lyon), Amélie ACHIM (Quebec). Pour s'inscrire, c'est [ici](#)!

<sup>1</sup> Achim, A. M., M. Maziade, E. Raymond, D. Olivier, C. Merette, and M.-A. Roy. 2011. "How Prevalent Are Anxiety Disorders in Schizophrenia? A Meta-Analysis and Critical Review on a Significant Association." *Schizophrenia Bulletin* 37 (4): 811–21. doi:10.1093/schbul/sbp148.